



Canutillo ISD Sick Child Policy

Under no circumstances may a parent/guardian bring a sick child to school. Sick children will expose all children and staff members who they come in contact with and in turn can expose other children. If other children become ill due to exposure to your sick child, either because he/she was returned to school before full recovery or because he/she was not picked up promptly upon notice of becoming ill, other parents will be unnecessarily inconvenienced. Because this is disruptive to other children and their families, your cooperation on this issue is extremely important.

In the event a child becomes ill and needs to be picked up, **the parent/guardian will be called and is expected to pick up the child within one hour (60 minutes).** If the parent/guardian cannot be reached, the emergency contact person will be called and asked to pick up the child.

Children With the Following Symptoms Should be Excluded From School	
Signs & Symptom	Child must be at home?
Fever: Elevated temperature of 100° F or greater demonstrates the need to exclude the student from the school setting.	YES - The student should be fever free (oral temperature below 100° F) without the use of fever-reducing medicines, for a complete school day (24 hours) before returning to school.
Flu Symptoms: Fever over 100° F or greater with cough and/or sore throat. Other flu symptoms can include fatigue, body aches, vomiting and/or diarrhea.	YES - for at least 24 hours after there is no longer a fever, without the use of fever-reducing medicines.
Coughing: Severe uncontrolled coughing or wheezing, rapid or difficult breathing. *	YES - seek medical advice. Medical attention may be necessary.
Allergies: Stuffy nose with clear drainage, sneezing, mild cough; no temperature elevation. *	NO – may attend only if there is no change from their usual symptoms, they have a documented history of allergies and they have not had close contact with a COVID-19 positive individual.
Mild Respiratory or Cold Symptoms: Stuffy nose with clear drainage, sneezing, mild cough; no temperature elevation. *	YES - may only attend with clearance from medical provider. Seek medical advice if the child had close contact with a COVID-19 positive individual.
Vomiting: Two or more episodes of vomiting in the past 24 hours.	YES - until vomiting resolves (no further vomiting for 24 hours). Observe for other signs of illness and for dehydration.
Diarrhea: Frequent, loose or watery stools compared to child's normal pattern; not caused by diet or medication.	YES - if the child looks or acts ill; if the child has diarrhea with temperature elevation of 100° F or greater; if child has diarrhea and vomiting.
Rash: Should be seen by a doctor to be cleared to be in school.	YES - seek medical advice. Any rash that spreads quickly, has open, weeping wounds and/or is not healing should be evaluated.
COVID-19 Symptoms (regardless of vaccination status): Fever, loss of taste or smell, cough and/or sore throat, headache, fatigue, body aches, vomiting and/or diarrhea	YES - may only attend with alternative diagnosis from medical provider. Seek medical advice if the child had close contact with a COVID-19 positive individual. May need to test for COVID-19 infection.

*If child has diagnosis of asthma or chronic allergies, please provide a note from their medical provider to the school nurse with the diagnosis and ensure that your child is taking any prescribed medication correctly.

Children With the Following Illness Should be Excluded From School

Illness	Child must be at home?
Conjunctivitis (pink eye) Pink/reddish color to white part of the eye and thick discharge may be yellow or greenish in color.	YES - discharge and signs of infection have cleared or completion of 24 hours of treatment with ophthalmic solution prescribed by a health care provider.
Strep Throat Contagious bacterial infection that can make your throat very sore and scratchy.	YES - for 24 hours after starting antibiotics. Your child also needs to be fever free and able to take part in usual activities.
Impetigo (to include: streptococci, staphylococcus, MRSA infections) Blister like lesions which develop into pustules. May "weep" and crust.	YES - for 24 hours after medical treatment initiated. Note: Exposed or open lesions must be covered for school attendance.
Ringworm A ring-shaped rash. Skin appears red, scaly, or cracked and is itchy. Untreated rash will spread.	NO - under the care of a medical provider Note: Exposed lesions must be covered for school attendance.
Vaccine Preventable Diseases Measles, Mumps, Rubella (German Measles), Chicken pox, Pertussis (Whooping Cough), Influenza	YES - until determined not infectious by medical care provider.
COVID-19 infection Positive antigen test (rapid) or molecular test (PCR) Symptoms may include: Loss of taste or smell, fever, cough, sore throat, headache, fatigue, body aches, vomiting and/or diarrhea	YES – isolation for 5 days. Must be fever free (oral temperature below 100° F) without the use of fever-reducing medicines and other symptoms are significantly better. Isolation for 10 days if new symptoms have appeared, are worse on day 5 or the child is unable to correctly wear a well-fitting mask. Seek medical advice if child is immunocompromised.

*Please notify and provide a note from their medical provider to the school nurse if your child is absent due to an illness.



Política de niños enfermos de Canutillo ISD

Bajo ninguna circunstancia un padre/tutor puede traer a un niño enfermo a la escuela. Los niños enfermos expondrán a todos los niños y miembros del personal con los que tengan contacto y, a su vez, pueden exponer a otros niños. Si otros niños se enferman debido a la exposición a su hijo enfermo, ya sea porque regresó a la escuela antes de que se recuperara por completo o porque no lo recogieron de inmediato cuando se notificó que esta enfermó, otros padres sufrirán molestias innecesarias. Debido a que esto es perjudicial para otros niños y sus familias, su cooperación en este tema es extremadamente importante.

En caso de que un niño se enferme y deba ser recogido, **se llamará al padre/tutor y se espera que recoja al niño dentro de una hora (60 minutos)**. Si no se puede localizar al padre/tutor, se llamará a la persona de contacto de emergencia y se le pedirá que recoja al niño.

Los niños con los siguientes síntomas deben ser excluidos de la escuela	
Signos y Síntomas	¿Debe quedarse en casa?
Fiebre: La temperatura elevada de 100° F o más demuestra la necesidad de excluir al estudiante del entorno escolar.	SÍ - El estudiante debe estar libre de fiebre (temperatura oral por debajo de 99 ° F) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, durante un día escolar completo (24 horas) antes de regresar a la escuela.
Síntomas de gripe: Fiebre de más de 100° F o más con tos y/o dolor de garganta. Otros síntomas de la gripe pueden incluir fatiga, dolores corporales, vómitos y/o diarrea.	SÍ - durante al menos 24 horas después de que ya no tenga fiebre, sin el uso de medicamentos para la fiebre.
Tos: Tos severa no controlada o sibilancias, respiración rápida o difícil. *	SÍ - buscar consejo médico. La atención médica puede ser necesaria.
Alergias: Nariz tapada con secreción clara, estornudos, tos leve; sin elevación de temperatura. *	NO - puede asistir solo si no hay cambios en sus síntomas habituales, tiene un historial documentado de alergias y no ha tenido contacto cercano con una persona positiva para COVID-19.
Síntomas respiratorios o de resfriado leves: Congestión con secreción clara, estornudos, tos leve; sin elevación de temperatura. *	SÍ - solo puede asistir con la autorización del proveedor médico. Busque atención médica si el niño tuvo contacto cercano con una persona positiva para COVID-19.
Vómitos: Dos o más episodios de vómitos en las últimas 24 horas.	SÍ - hasta que se resuelvan los vómitos (no más vómitos durante 24 horas). Observe otros signos de enfermedad y deshidratación.
Diarrea: Deposiciones frecuentes, blandas o acuosas en comparación con el patrón normal del niño; no causado por la dieta o por medicamento.	SÍ - si el niño se ve o actúa enfermo; si el niño tiene diarrea con elevación de temperatura de 100° F o más; si el niño tiene diarrea y vómitos.
Erupción: Debe ser visto por un médico para ser autorizado para estar en la escuela.	SÍ - buscar consejo médico. Se debe evaluar cualquier sarpullido que se propague rápidamente, tenga heridas abiertas que supuren y/o no se esté curando.
Síntomas de COVID-19 (independientemente del estado de vacunación): Fiebre, pérdida del gusto o del olfato, tos y/o dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, dolores corporales, vómitos y/o diarrea	SÍ - solo puede asistir con un diagnóstico alternativo del proveedor médico. Busque atención médica si el niño tuvo contacto cercano con una persona positiva para COVID-19. Es posible que deba hacerse una prueba de infección por COVID-19.

*Si el niño tiene un diagnóstico de asma o alergias crónicas, proporcione una nota de su proveedor médico a la enfermera de la escuela con el diagnóstico y asegúrese de que su hijo esté tomando correctamente los medicamentos recetados.

Los niños con las siguientes enfermedades deben ser excluidos de la escuela

Enfermedad	¿Debe quedarse en casa?
Conjuntivitis (ojo rojo) Color rosa/rojizo en la parte blanca del ojo y la secreción espesa puede ser de color amarillo o verdoso.	SÍ: la secreción y los signos de infección han desaparecido o se han completado 24 horas de tratamiento con solución oftálmica recetada por un proveedor de atención médica.
Faringitis Estreptocócica Infección bacteriana contagiosa que puede causar mucho dolor y picazón en la garganta.	SÍ - durante las 24 horas siguientes al inicio de los antibióticos. Su hijo también debe estar libre de fiebre y poder participar en las actividades habituales.
Impétigo (para incluir: estreptococos, estafilococos, infecciones por MRSA) Ampolla como lesiones que se convierten en pústulas. Pueden supurar y formar costras.	SI - durante las 24 horas siguientes al inicio del tratamiento médico. Nota: Las lesiones expuestas o abiertas deben estar cubiertas para asistir a la escuela.
Tiña Una erupción en forma de anillo. La piel se ve roja, escamosa o agrietada y pica. La erupción no tratada se extenderá.	NO - bajo el cuidado de un proveedor médico Nota: Las lesiones expuestas deben estar cubiertas para asistir a la escuela.
Enfermedades prevenibles por vacunación Sarampión, paperas, rubéola (sarampión alemán), varicela, tos ferina (tos ferina), influenza	SÍ - hasta que el proveedor de atención médica determine que no es infeccioso.
Contagio de COVID-19 Prueba de antígeno positiva (rápida) o prueba molecular (PCR) Los síntomas pueden incluir: pérdida del gusto o del olfato, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, dolores corporales, vómitos y/o diarrea	SI – aislamiento por 5 días. Debe estar libre de fiebre (temperatura oral por debajo de 99º F) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas mejoran significativamente. Aislamiento durante 10 días si han aparecido nuevos síntomas, empeoran el día 5 o el niño no puede usar correctamente una máscara que le quede bien. Busque consejo médico si el niño está inmunocomprometido.

*Por favor notifique y proporcione una nota de su proveedor médico a la enfermera de la escuela si su hijo está ausente debido a una enfermedad.